

**Prospect: Informații pentru utilizator****Faringo Intensiv 8,75 mg pastile**

Flurbiprofen

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitați.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Faringo Intensiv și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Faringo Intensiv
3. Cum să luați Faringo Intensiv
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Faringo Intensiv
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Faringo Intensiv și pentru ce se utilizează**

Faringo Intensiv conține flurbiprofen. Flurbiprofenul aparține unui grup de medicamente cunoscute sub denumirea de medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS). Aceste medicamente acționează prin modificarea modului în care organismul răspunde la durere, inflamație și febră.

Faringo Intensiv este utilizat pentru ameliorarea de scurtă durată a simptomelor de la nivelul gâtului cum sunt durere în gât, iritație, inflamație și dificultate la înghițire, la adulți și adolescenți cu vârstă peste 12 ani.

Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**2. Ce trebuie să știți înainte să luați Faringo Intensiv****Nu luați Faringo Intensiv**

- Dacă sunteți alergic la flurbiprofen sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6).
- Dacă ați avut astm bronșic, sunete respiratorii neșteptate sau respirație dificilă, secreții nazale, umflături ale feței sau erupție pe piele însorită de mâncărime (urticarie) după ce ați luat acid acetilsalicilic sau orice alt medicament AINS.

- Dacă aveți sau ați avut ulcer (două sau mai multe episoade de ulcer gastric sau duodenal) la nivelul stomacului sau intestinului.
- Dacă ați avut sângeare sau perforație gastro-intestinală, colită severă sau tulburări ale săngelui după ce ați utilizat un alt AINS.
- Dacă sunteți în ultimul trimestru de sarcină.
- Dacă aveți sau ați avut insuficiență severă la nivelul inimii, ficatului sau rinichiului.

### **Atenționări și precauții**

Înainte să luați Faringo Intensiv, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului:

- Dacă ați avut vreodată astm bronșic sau suferiți de alergii
- Dacă aveți amigdalită (inflamație a amigdalelor) sau dacă credeți că puteți avea o infecție bacteriană la nivelul gâtului (deoarece este posibil să aveți nevoie de antibiotice)
- Dacă aveți probleme ale inimii, ficatului sau rinichiilor
- Dacă ați avut un accident vascular cerebral
- Dacă aveți antecedente de boli intestinale (colită ulcerativă, boala Crohn)
- Dacă aveți tensiune arterială mare
- Dacă aveți o boală autoimună cronică (inclusiv lupus eritematos sistemic sau boală mixtă a țesutului conjunctiv)
- Dacă sunteți o persoană în vîrstă, deoarece este mai probabil să dezvoltați reacțiile adverse enumerate în acest prospect
- Dacă sunteți în primele 6 luni de sarcină sau în perioada de alăptare.

### **În timp ce utilizați Faringo Intensiv**

- La primul semn de reacție pe piele (erupție trecătoare pe piele, decojire a pielii) sau alte semne de reacție alergică, opriți administrarea acestui medicament și adresați-vă imediat unui medic.
- Raportați medicului dumneavoastră orice simptome abdominale neobișnuite (în special sângeare). Dacă nu vă simțiți mai bine, vă simțiți mai rău sau dezvoltați noi simptome, discutați cu medicul dumneavoastră.
- Utilizarea medicamentelor care conțin flurbiprofen poate fi asociată cu o creștere ușoară a riscului de infarct miocardic sau accident vascular cerebral. Orice risc este mai probabil în cazul administrării de doze mari sau al tratamentului prelungit. Nu depășiți doza recomandată sau durata tratamentului (3 zile).

### **Copii**

Nu administrați acest medicament copiilor cu vîrstă sub 12 ani.

### **Faringo Intensiv împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv medicamente obținute fără prescripție medicală. În mod special, spuneți medicului dacă luați:

- acid acetilsalicilic în doze mici (până la 75 mg pe zi)
- medicamente pentru tensiune arterială mare sau insuficiență cardiacă (antihipertensive, glicoizide cardiace)
- medicamente pentru corectarea echilibrului hidric (diuretice, inclusiv medicamente care economisesc potasiu)
- medicamente pentru subțierea săngelui (anticoagulante, medicamente antiplachetare)
- medicamente pentru tratamentul gutei (probenecid, sulfpirazonă)
- alte medicamente AINS sau corticosteroizi (cum sunt celecoxib, ibuprofen, diclofenac sodic sau prednisolon)
- mifepristonă (un medicament utilizat pentru întreruperea sarcinii)
- antibiotice din clasa chinolonelor (cum este ciprofloxacina)
- ciclosporină sau tacrolimus (medicamente utilizate pentru suprimarea sistemului imunitar)
- fenitoină (medicament utilizat pentru tratamentul epilepsiei)
- metotrexat (medicament utilizat pentru tratamentul bolilor autoimune sau cancerului)
- litiu sau inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (medicamente utilizate pentru tratamentul depresiei)

- antidiabetice orale (pentru tratamentul diabetului zaharat)
- zidovudină (pentru tratamentul HIV).

### **Faringo Intensiv împreună cu alimente, băuturi și alcool**

Alcoolul trebuie evitat în timpul tratamentului cu Faringo Intensiv, deoarece poate crește riscul de sângerare la nivelul stomacului sau intestinului.

### **Sarcina și alăptarea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Flurbiprofenul aparține unui grup de medicamente care pot afecta fertilitatea la femei. Acest efect este reversibil atunci când încetați să luați medicamentul. Este puțin probabil ca aceste pastile să afecteze posibilitatea de a rămâne gravidă, atunci când sunt luate ocazional; cu toate acestea, spuneți medicului dumneavoastră înainte de a lua acest medicament dacă aveți dificultăți de a rămâne gravidă.

Nu luați acest medicament dacă sunteți în ultimul trimestru de sarcină. Dacă sunteți în primele 6 luni de sarcină sau dacă alăptați, discutați cu medicul dumneavoastră înainte să luați acest medicament.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacitatei de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. Cu toate acestea, amețelile și tulburările de vedere sunt reacții adverse posibile după administrarea AINS. În cazul în care prezentați aceste tulburări, nu trebuie să conduceți vehicule sau să folosiți utilaje.

### **Faringo Intensiv conține zahăr și glucoză**

Acest medicament conține zahăr și glucoză. Dacă vi s-a spus de către medicul dumneavoastră că aveți intoleranță la anumite categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

## **3. Cum să luați Faringo Intensiv**

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată este:

Adulți și adolescenti cu vîrstă peste 12 ani:

O pastilă la interval de 3-6 ore, **după cum este necesar**.

Nu luați mai mult de 5 pastile în interval de 24 ore.

- Luați 1 pastilă și lăsați-o să se dizolve ușor în interiorul gurii.
- Deplasați întotdeauna pastila în cavitatea bucală, în timp ce se dizolvă.

### **Administrarea la copii:**

Nu administrați aceste pastile la copii cu vîrstă sub 12 ani.

**ACESTE PASTILE SUNT PENTRU TRATAMENT PE TERMEN SCURT.** Trebuie să luați numărul minim de pastile, pe perioada minimă necesară pentru ameliorarea simptomelor. Dacă apare iritație la nivelul cavității bucale, tratamentul cu flurbiprofen trebuie întrerupt.

**Nu luați Faringo Intensiv mai mult de 3 zile**, cu excepția cazului în care medicul vă spune să faceți acest lucru. Dacă nu vă simțiți mai bine, vă simțiți mai rău sau vă apar simptome noi, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul.

### **Dacă luați mai mult Faringo Intensiv decât trebuie**

Discutați cu medicul sau cu farmacistul sau mergeți imediat la cel mai apropiat spital. Simptomele de supradozaj pot include: greață sau vârsături, durere de stomac sau, mai rar, diaree. De asemenea, sunt posibile țuituri în urechi, durere de cap sau sângeare gastro-intestinală.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

#### 4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

OPRIȚI ADMINISTRAREA acestui medicament și adresați-vă imediat unui medic dacă prezentați:

- semne de reacții alergice cum sunt astm bronșic, respirație ţuierătoare neașteptată sau dificultate la respirație, mâncărime, secreții nazale, erupții trecătoare pe piele etc.
- umflare la nivelul feței, limbii sau gâtului, care provoacă dificultate la respirație, bătăi rapide ale inimii și tensiune arterială mică, care poate duce la soc (acestea pot apărea chiar și la prima administrare a medicamentului).
- reacții severe la nivelul pielii, cum sunt descuamare, formare de bășici sau cojire a pielii.

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă observați oricare dintre următoarele reacții adverse sau orice alte reacții care nu sunt descrise:

Alte reacții adverse care pot să apară:

**Frecvențe** (*pot afecta până la 1 din 10 persoane*)

- amețeli, durere de cap
- iritație la nivelul gâtului
- ulcerăție sau durere la nivelul gurii
- durere de gât
- disconfort sau senzație neobișnuită la nivelul gurii (cum sunt senzațiile de căldură, arsură, furnicături, încălziri etc).
- greață și diaree
- senzație de furnicături și mâncărime la nivelul pielii

**Mai puțin frecvențe** (*pot afecta până la 1 din 100 persoane*):

- moleșeală
- stare de somnolență sau dificultate de a adormi
- agravare a astmului bronșic, respirație ţuierătoare, respirație dificilă
- formare de bășici la nivelul gurii sau gâtului, senzație de amorteașă la nivelul gâtului.
- senzație de gură uscată
- senzație de arsură la nivelul gâtului, modificare a senzației gustative, balonare la nivelul stomacului, durere abdominală, gaze, constipație, indigestie, vârsături
- scădere a senzațiilor la nivelul gâtului
- febră, durere
- erupții trecătoare la nivelul pielii, mâncărime a pielii

**Reacții adverse rare** (*pot afecta cel mult 1 din 1000 persoane*)

- reacții anafilactice

**Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile):**

- anemie, trombocitopenie (număr scăzut de plachete în sânge, ceea ce poate duce la apariția de vânătăi și sângeare), umflare (edem), tensiune arterială mare, insuficiență cardiacă sau infarct miocardic

- forme severe de reacții la nivelul pielii, cum sunt reacții buloase, inclusiv sindrom Stevens-Johnson, sindrom Lyell și necroliză epidermică toxică
- hepatită (inflamație a ficatului)

#### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

#### **5. Cum se păstrează Faringo Intensiv**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați Faringo Intensiv după data de expirare înscrisă pe cutie și pe blister, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

#### **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

##### **Ce conține Faringo Intensiv**

Substanța activă este flurbiprofen. O pastilă conține flurbiprofen 8,75 mg.

Celealte componente sunt:

Zahăr

Glucoză lichidă

Macrogol 300

Ulei de mentă

Levomentol

##### **Cum arată Faringo Intensiv și conținutul ambalajului**

Faringo Intensiv 8,75 mg pastile se prezintă sub formă de pastile rotunde, translucide până la gălbui, cu diametrul de  $19\pm1$  mm.

Pastile sunt disponibile în ambalaje cu blister din PVC-PVDC/Aluminiu.

Mărimi de ambalaj: cutii cu 8, 12, 16, 20 sau 24 pastile.

##### **Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricanții**

##### **Deținătorul autorizației de punere pe piață**

Terapia SA

Str. Fabricii, nr. 124, Cluj-Napoca

România

##### **Fabricanții**

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

Site Diététique et Pharmacie

Zone Industrielle de la Coudette  
32290 Aignan,  
Franța

LOZY'S PHARMACEUTICALS, S.L.  
Campus Empresarial s/n 31795 Lekaroz Navarra  
Spania

**Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spațiului Economic European (SEE) sub următoarele denumiri comerciale:**

Spania: Verofen pastillas para chupar  
Italia: Flurbiprofen Geiser 8,75 mg pastiglie  
Polonia: Ultravox Maxe smak miętowy  
Portugalia: Mentocaína F  
România: Faringo Intensiv 8,75 mg pastile

**Acest prospect a fost revizuit în aprilie 2017.**